

レジメンスケジュール

診療科	消化器外科
適応	D2郭清施行後のSTAGEIII胃癌(術後補助)
レジメン	胃DS療法

申請・改訂日	2020年6月
備考	術後補助化学療法

クール関連
下記の通り

使用した臨床データ
がん化学療法レジメンハンドブック

1クール																				
投与順	抗がん剤	薬品名	投与量	投与方法	時間・速度	備考	day1	day21	
①	○	S-1	40mg/m ² /回	内服	1日2回朝夕		day1-14投与後休薬(2投1休)													終了
						体表面積1.5m ² 以上: 120mg/day 体表面積1.25~1.5m ² : 100mg/day 体表面積1.0m ² 以下: 80mg/day														

2~7クール																				
投与順	抗がん剤	薬品名	投与量	投与方法	時間・速度	備考	day1	day21	
①		デキサメタゾン注	6.6mg	メイン	15分		○													
		生理食塩液	50mL																	
②	○	ドセタキセル	40mg/m ²	メイン	60分		○													
		5%ブドウ糖液	250mL																	
③		生理食塩液	50mL	フラッシュ	全開		○													
④	○	S-1	40mg/m ² /回	内服	1日2回朝夕		day1-14投与後休薬(2投1休)													終了
						体表面積1.5m ² 以上: 120mg/day 体表面積1.25~1.5m ² : 100mg/day 体表面積1.0m ² 以下: 80mg/day														

8~12クール																				
投与順	抗がん剤	薬品名	投与量	投与方法	時間・速度	備考	day1	day42	
①	○	S-1	40mg/m ² /回	内服	1日2回朝夕		day1-28投与後休薬(4投2休)													終了
						体表面積1.5m ² 以上: 120mg/day 体表面積1.25~1.5m ² : 100mg/day 体表面積1.0m ² 以下: 80mg/day														

投与量	ドセタキセル	S-1(※用法用量外)		
		1.25m ² 未満	1.25-1.5m ²	1.5m ² 以上
1段階減量	35mg/m ²	※40+20mg	40mg/回	50mg/回
2段階減量	30mg/m ²	25mg/回	※40+20mg	40mg/回

休薬基準

術後補助治療中のS-1休止：15日目（8コース目以降は29日目）までに回復しない場合は次コースまで休薬

副作用	休薬基準	コース内再開基準
好中球数	1000/mm ³ 未満	1500/mm ³ 以上
血小板数	75000/mm ³ 未満	75000/mm ³ 以上
血清クレアチニン	1.2mg/dL超	1.2mg/dL以下
下痢、粘膜炎、口内炎、悪心嘔吐、食欲不振	G2以上	G1以下

減量基準

両薬剤

副作用	程度	対処
好中球数	500/mm ³ 未満	1段階減量
FN	G3以上	1段階減量
血小板数	50000/mm ³ 未満	1段階減量
血清クレアチニン	1.2mg/dL超	1段階減量
下痢、粘膜炎、口内炎、悪心嘔吐、食欲不振	G3以上	1段階減量
その他の非血液毒性	G3以上	1段階減量

2コース目以降の治療開始基準

術後補助治療中のS-1休止：15日目（8コース目以降は29日目）までに回復しない場合は次コースまで休薬

副作用	開始基準
好中球数	1000/mm ³ 以上
血小板数	75000/mm ³ 以上
AST/ALT	100IU/L以下
ビリルビン	1.5mg/dL以下
血清クレアチニン	1.2mg/dL以下
下痢、粘膜炎、口内炎、悪心嘔吐、食欲不振	G1以下