

## レジメンスケジュール

|      |            |
|------|------------|
| 診療科  | 消化器外科      |
| 適応   | 転移再発胃癌     |
| レジメン | 胃SP療法(4週間) |

|        |          |
|--------|----------|
| 申請・改訂日 | 2020年11月 |
| 備考     | 1st line |

|          |  |
|----------|--|
| クール関連    |  |
| 通常6コースまで |  |

|                  |  |
|------------------|--|
| 使用した臨床データ        |  |
| がん化学療法レジメンハンドブック |  |

| 全クール |      |          |           |      |   |            |                  |     |       |                             |       |     |     |     |     |     |     |     |       |    |  |
|------|------|----------|-----------|------|---|------------|------------------|-----|-------|-----------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----|--|
| 投与順  | 抗がん剤 | 薬品名      | 投与量       | 投与方法 | 時間・速度   | 備考         | day1             | ... | day8  | day9                        | day10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | day28 |    |  |
| メイン① |      | 酢酸リンゲル液  | 500mL     | メイン  | 120分  |            |                  |     | ○     |                             |       |     |     |     |     |     |     |     |       |    |  |
| メイン② |      | 酢酸リンゲル液  | 500mL     | メイン  | 120分  |            |                  |     | ○     |                             |       |     |     |     |     |     |     |     |       |    |  |
|      |      | アプレピタント  |           | 内服   | シスプラチン投与1時間前  | 点滴も可       |                  |     | 125mg | 朝80mg                       | 朝80mg |     |     |     |     |     |     |     |       |    |  |
| 側①   |      | デキサメタゾン注 | 9.9mg     | 側管   | 30分   | ①と同時に開始    |                  |     | ○     |                             |       |     |     |     |     |     |     |     |       |    |  |
| 側①   |      | パロノセトロン注 | 0.75mg    |      |   |            |                  |     | ○     |                             |       |     |     |     |     |     |     |     |       |    |  |
| 側①   |      | 生理食塩液    | 100mL     |      |   |            |                  |     | ○     |                             |       |     |     |     |     |     |     |     |       |    |  |
| 側②   | ○    | シスプラチン   | 60mg/m2   | 側管   | 120分  | total500mL |                  |     | ○     | シスプラチン投与後数日間は飲水励行。補液追加も検討を。 |       |     |     |     |     |     |     |     |       | 終了 |  |
|      |      | 生理食塩液    | 500mL     |      |   |            |                  |     |       |                             |       |     |     |     |     |     |     |     |       |    |  |
| メイン③ |      | 酢酸リンゲル液  | 500mL     | メイン  | 240分  |            |                  |     | ○     |                             |       |     |     |     |     |     |     |     |       |    |  |
| メイン④ |      | 酢酸リンゲル液  | 500mL     | メイン  | 240分  |            |                  |     | ○     |                             |       |     |     |     |     |     |     |     |       |    |  |
|      | ○    | S-1      | 40mg/m2/回 | 内服   | 1日2回朝夕  |            | day1-21後休薬(3投1休) |     |       |                             |       |     |     |     |     |     |     |     |       |    |  |
|      |      |          |           |      | 体表面積1.5m2以上:120mg/day<br>体表面積1.25~1.5m2:100mg/day<br>体表面積1.0m2以下:80mg/day |            |                  |     |       |                             |       |     |     |     |     |     |     |     |       |    |  |

| 投与量   | シスプラチン  | S-1(※用法用量外) |            |         |
|-------|---------|-------------|------------|---------|
|       |         | 1.25m2未満    | 1.25-1.5m2 | 1.5m2以上 |
| 通常量   | 60mg/m2 | 40mg/回      | 50mg/回     | 60mg/回  |
| 1段階減量 | 50mg/m2 | 休薬          | 40mg/回     | 50mg/回  |
| 2段階減量 | 40mg/m2 | 休薬          | 休薬         | 40mg/回  |

## 減量・中止基準

| 両薬剤   |                          |  |
|-------|--------------------------|--|
| 副作用   | 程度                       | 対処   |
| 非血液毒性 | G4以上                     | 休薬、回復後別表の通り減量                                |
| 白血球数  | 2000/mm <sup>3</sup> 未満  | 休薬、回復後別表の通り減量                                |
| 好中球数  | 1000/mm <sup>3</sup> 未満  | 休薬、回復後別表の通り減量                                |
| 血小板数  | 50000/mm <sup>3</sup> 未満 | 休薬、回復後別表の通り減量                                |
| FN    | 発現時                      | 休薬、回復後別表の通り減量                                |
| 肝機能障害 | G2以上                     | 休薬、回復後別表の通り減量                                |
| 腎障害   | Ccr60～80mL/min           | シスプラチン通常量、S1 1段階減量                           |
|       | Ccr30～60mL/min           | シスプラチン50%減量、S-1 1段階以上の減量(30-40mL/minでは2段階減量) |
|       | Ccr30以下                  | シスプラチン中止                                     |