

レジメンスケジュール

診療科	血液内科
適応	悪性リンパ腫
レジメン	血内GEM(3投1休)療法

申請・改訂日	2019年5月
備考	

クール関連

使用した臨床データ
がん化学療法レジメンハンドブック

全クール																			
投与順	抗がん剤	薬品名	投与量	投与方法	時間・速度	備考	day1	...	day8	...	day15	day28
①		デキサメタゾン注	6.6mg	メイン	15分		○		○		○								
		生理食塩液	50mL				○		○		○								
②	○	ゲムシタビン	1000mg/m ²	メイン	30分		○		○		○								
		生理食塩液	100mL				○		○		○								
③		生理食塩液	50mL	メイン	全開		○		○		○								

終了

投与開始基準(GDP療法より引用)

day1	好中球数1500/mm ³ 以上、血小板数10万/mm ³ 以上、AST/ALT基準値の2.5倍未満、総ビリルビン基準値の1.5倍未満であること。 好中球数が1000/mm ³ 未満または血小板数が10万/mm ³ 未満である場合は治療を1週間延期すること。
day8とday15	好中球数500/mm ³ 以上、血小板数5万/mm ³ 以上であること。

減量・中止基準(GDP療法より引用)

副作用	程度	処置
骨髄抑制	day8の好中球数が500/mm ³ 未満または血小板数が5万/mm ³ 未満の場合	day8のGEMを中止するか、day15の好中球数500/mm ³ 以上かつ血小板数5万/mm ³ 以上でday15に投与する。
	day8の好中球数が500～900/mm ³ の場合	G-CSFを開始してGEMを投与するか、GEMを25%減量し投与する。
	day8の血小板数が5万～9万9千/mm ³ の場合	GEMを25%減量し投与する。
非血液毒性	G3以上	GEMを25%減量し投与する。
その他	リンパ腫の増大、新出病変の出現、間質性肺炎疑い	投与中止する。