

レジメンスケジュール

診療科	血液内科
適応	成人T細胞性白血病・リンパ腫
レジメン	血内mLSG-15療法

申請・改訂日	2019年7月
備考	1,3,5クール回復期に髄注(AraC40mg+MTX15mg+PSL20mg)

クール関連	
	総6コース

使用した臨床データ	
	JCOG0907参照のこと

全クール																			
投与順	抗がん剤	薬品名	投与量	投与方法	時間・速度	備考	day1	...	day8	...	day15	day16	day17	day28
①		3号液	500mL	メイン	ルートキープ	残最終抗がん剤後フラッシュ	○		○		○	○	○						
②		プレドニゾン注	40mg/m2	側①	15分	プレソニゾン内服可	○		○		○	○	○						
②		グラニセトン注	3mg																
②		生理食塩液	50mL																
③	○	ビンクリスチン	1mg/m2	側②	15分	最大2mg/body	○												
		生理食塩液	50mL																
④	○	ドキシルピシン	40mg/m2	側③	30分		○		30mg/m2										
		生理食塩液	100mL																
⑤	○	シクロフォスファミド	350mg/m2	側④	120分	閉鎖式器具使用	○												
		生理食塩液	500mL																
⑥	○	ラニムスチン	60mg/m2	側⑤	60分	調製後遮光	○		○										
		生理食塩液	100mL																
⑦	○	ビンデシン	2.4mg/m2	側⑥	15分						○								
		生理食塩液	50mL																
⑧	○	エトポシド	100mg/m2	側⑦	120分		○		○		○	○	○						
		5%ブドウ糖液	500mL																
⑨	○	カルボプラチン	250mg/m2	側⑧	120分	投与日は2000mL以上の尿量確保					○								
		生理食塩液	500mL																
																			終了

JCOG0907参照のこと