

レジメンスケジュール

診療科	呼吸器内科
適応	非小細胞肺癌
レジメン	肺CBDCA+DTX療法

申請・改訂日	2011年4月
備考	修正済み

クール関連
1クール3~4週ごと

使用した臨床データ
がん化学療法レジメンハンドブック等

全クール																						
投与順	抗がん剤	薬品名	投与量	投与方法	時間・速度	備考	day1	day21-28			
①		パロノセトロン注	0.75mg	メイン	15分		○															
		デキサメタゾン注	9.9mg																			
		生理食塩液	50mL																			
②	○	ドセタキセル	70mg/m2	メイン	60分		○															
		5%ブドウ糖液	250mL																			
③	○	カルボプラチン	AUC5	メイン	60分		○															
		5%ブドウ糖液	250mL																			
④		生理食塩液	50mL	メイン	全開		○															

ドセタキセル	
通常量	60mg/m2
1段階減量	50mg/m2
2段階減量	40mg/m2
3段階減量	30mg/m2

減量・中止基準

カルボプラチン		
副作用	程度	対処法
血液毒性	白血球数2500/mm ³ 未満、血小板75000/mm ³ 未満	1週延期し、25%減量
FN	発現時	回復するまで延期し、25%減量
ドセタキセル		
副作用	程度	処置
血液毒性	G4、FN	1段階減量
非血液毒性	G3	1段階減量
肝機能障害	T-Bil>ULN	投与中止
	AST/ALT>1.5×ULNかつALP>2.5×ULN	投与中止