

レジメンスケジュール

診療科	呼吸器内科
適応	非小細胞肺癌
レジメン	肺CBDCA+S-1療法

申請・改訂日	2020年12月
備考	3～6クール施行

クール関連	
	下記の通り

使用した臨床データ	
	がん化学療法レジメンハンドブック等

1クール～																						
投与順	抗がん剤	薬品名	投与量	投与方法	時間・速度	備考	day1	day21		
①		グラニセロン注	3mg	メイン	15分		○															
		デキサメタゾン注	9.9mg																			
		生理食塩液	50mL																			
②	○	カルボプラチン	AUC5	メイン	60分		○															
		5%ブドウ糖液	250mL																			
③		生理食塩液	50mL	メイン	全開	フラッシュ	○															
④	○	S-1	40mg/m ² /回	内服	1日2回朝夕			day1-14後休薬(2投1休)														

投与量	S-1(mg/日)		
	1.25m ² 未満	1.25-1.5m ²	1.5m ² 以上
通常量	80	100	120
1段階減量	休薬	80	100
2段階減量	休薬	休薬	80

Ccr(mL/min)	S-1
80以上	初回基準量
60～80	初回基準～1段階減量
※30～60	原則として1段階以上減量

※30～40mL/minでは2段階減量が望ましい

減量・中止基準

カルボプラチン

副作用	程度	対処法
血液毒性	G4	20～25%減量
腎機能障害	GFR値次第	カルバート式にて計算

S-1

副作用	程度	対処法
血液毒性	G4	1段階減量
非血液毒性	G3以上	1段階減量