

## レジメンスケジュール

診療科	泌尿器科
適応	進行・再発の尿路上皮癌(膀胱癌)
レジメン	GCarbo(4週間)療法

申請・改訂日	2015年9月
備考	

クール関連

使用した臨床データ
がん化学療法レジメンハンドブック等

投与順	抗がん剤	薬品名	投与量	投与方法	時間・速度	備考	day1	day2	...	day8	...	day15	...	...	...	...	...	...	day28	
①		グラニセトロン注	3mg	メイン	15分			○											終了	
		デキサメタゾン注	6.6mg				○	○		○		○								
		生理食塩液	50mL				○	○		○		○								
②	○	ゲムシタピン	1000mg/m2	メイン	30分															
		生理食塩液	100mL				○			○		○								
③	○	カルボプラチン	AUC5	メイン	60分			○												
		5%ブドウ糖液	250mL																	
④		生理食塩液	50mL	メイン	全開		○	○		○		○								

## 投与開始基準

項目	程度
白血球数	3000/mm以上
好中球数	1500/mm以上
血小板数	100000/mm <sup>3</sup> 以上
ヘモグロビン値	10g/dL以上
PS	0~2
AST/ALT	正常値上限の3倍未満
T-Bil	正常値上限の1.5倍未満
Ccr値	30mL/min以上

## 減量・中止基準

副作用	程度	対処法
白血球減少	2000/mm <sup>3</sup> 未満	休薬し、減量はしなくてもよい
好中球減少	1000/mm <sup>3</sup> 未満	休薬し、減量はしなくてもよい
血小板減少	70000/mm <sup>3</sup> 未満	休薬し、減量はしなくてもよい
非血液毒性	G4または再発性のG3	休薬し、減量はしなくてもよい