

レジメンスケジュール

診療科	泌尿器科
適応	尿路上皮癌
レジメン	尿路上皮GEM+PTX療法

申請・改訂日	2017年3月
備考	

クール関連	
-------	--

使用した臨床データ	
がん化学療法レジメンハンドブック等	

全クール																						
投与順	抗がん剤	薬品名	投与量	投与方法	時間・速度	備考	day1	...	day8	...	day15	day21			
①		酢酸リンゲル液	500mL	メイン	ルートキープ		○		○		○											
②		グラニセトロン注	3mg	側管①	30分		○		○		○											
		デキサメタゾン注	16.5mg				○		6.6mg		6.6mg											
		ファモチジン注	20mg				○															
		クロルフェニラミン注	5mg				○															
		生理食塩液	100mL				○		○		○											
③	○	パクリタキセル	200mg/m2	側管①	180分	要PVCルート・フィルター	○															
		生理食塩液	100mL																			
④	○	ゲムシタピン	1000mg/m2	側管②	30分		○		○		○											
		生理食塩液	100mL																			
⑤		生理食塩液	50mL	側管③	全開	残フラッシュ	○		○		○											

終了

投与可能基準

両薬剤	
項目	程度
好中球数	2000/mm ³ 超
血小板数	100000/mm ³ 超
ヘモグロビン値	9.5g/dL超
AST/ALT値	2.0×ULN未満
T-Bil値	1.5mg/dL未満
血清クレアチニン値	1.5mg/dL未満

減量・中止基準

両薬剤		
副作用	程度	処置
血液毒性	G3以上	休薬、次回より20%減量する
非血液毒性	G2(悪心、嘔吐、食欲不振、疲労、脱毛を除く)	GEMのみ20%減量
	G3以上	休薬、次回より20%減量する