

ご依頼下さる先生へ ～ 核医学検査のご予約をいただくにあたり～

検査実施日は...

平日(月～金曜日)の午前中に行います。
検査の予約状況により異なりますが、患者さんのご来院時間は午前の時間になります。
検査開始時間は、上記の範囲内で、極力ご要望に合わせて設定致します。

食事制限や前処置の有無は...

甲状腺ヨード摂取率検査以外は、ほぼありません。(下表 ※印をご参照下さい)
詳細については、検査をご依頼いただいた際にお電話にてお答えいたします。
また、検査に関するご質問についても、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。

核医学検査 項目別

検査名	静注後から撮影までの時間	撮影時間	投与方法
骨シンチ	4～6時間後	30～40分	静注
ガリウムシンチ	2～3日後	30～40分	静注
肝シンチ	10～20分後	約20分	静注
肝機能シンチ	直後	30～40分	静注
心筋交感神経シンチ	約30分後及び3～4時間後	各30～40分	静注
心筋脂肪酸代謝シンチ(BMIPP)	約20分後	約15分	静注
安静時心筋シンチ	1～2時間後	約15分	静注
安静時(TI+BMIPP)心筋シンチ	20～30分後	約15分	静注
脳血流(SPECT)	直後	40～50分	静注
肺血流シンチ	直後	20～30分	静注
甲状腺テクネシンチ	約30分後	約10分	静注
甲状腺タリウムシンチ	約10分後及び2時間後	20～30分	静注
甲状腺ヨード摂取率※	6時間後及び24時間後	約10分	経口
唾液腺シンチ	直後	30～40分	静注
副腎皮質シンチ	7日後及び8日後	約10分	静注
副腎髄質シンチ	翌日及び翌々日	約40分	静注
副甲状腺シンチ	10分後及び2時間後	10～20分	静注
レノグラム	直後	30～40分	静注

※ 甲状腺ヨード摂取率検査について

甲状腺治療薬は測定値に大きく影響します。

投薬を中止するか否かは主治医の指示を受けて下さい。(中止の場合は1～4週の期間が必要です)

○ 検査前の一週間はヨード(海藻類・昆布だし・寒天類など)禁食して下さい。

○ ヨード造影剤を使用する造影CTやIP等は、甲状腺ヨード摂取率検査以前2～3週間に行わないで下さい。

核医学(RI・シチ)検査をお受けになる方へ

核医学検査とは...

微量の放射線を出す薬を静脈注射し、その薬の分布を写真にして診断する検査です。
使用する放射線は極微量ですので、身体への害は心配ありません。

検査当日の流れ

紹介状・健康保険証・当院診察券(お持ちの方)を持参のうえ、
検査予約時間の15分前までに、
日本鋼管病院 外来棟1階 受付窓口におこしてください。

注) 緊急の搬送等があった場合など、検査が予約時間よりも多少遅れる場合がございます。
恐れ入りますが予めご了承ください。

ご注意下さい

- ◆ アイソトープの検査薬は、当日しか使えない高価な特殊薬品を準備致しますので、
ご都合が悪くなった場合は、前日までに下記へご連絡下さい。
また、当日はご予約の時間を厳守いただきますようお願い致します。
- ◇ 甲状腺ヨード摂取率以外の検査は、食事制限や前処置の有無はほぼありません。
- ◇ 検査結果については後日、ご紹介いただいた病院の担当医師からお聞きになって下さい。
- ◇ 都合により遅れる場合・ご来院できなくなった場合や、ご不明の点は下記までご連絡願います。

ご連絡の無い場合は、検査開始時間が遅れることがありますのであらかじめご了承下さい。

～ 検査に間に合わない場合や、その他のお問い合わせのご連絡は ～

地域連携室 ファイナル 0120-961-778 (平日 9:00～17:00・土曜 9:00～14:00)

携帯電話からは TEL 044-366-1077

救急外来 TEL 044-333-5591 (その他の時間帯)