

レジメンスケジュール

診療科	乳腺外科
適応	乳癌術前後補助療法
レジメン	乳TC療法

申請・改訂日	2011年2月
備考	

クール関連
下記の通り、総4クール

使用した臨床データ
がん化学療法レジメンハンドブック等

全クール																						
投与順	抗がん剤	薬品名	投与量	投与方法	時間・速度	備考	day1	day2	day3	day21			
①		デキサメタゾン注	9.9mg	メイン	15分		○															
		グラニセトロン注	3mg																			
		生理食塩液	50mL																			
②	○	ドセタキセル	75mg/m ²	メイン	60分		○															
		生理食塩液	250mL																			
③	○	シクロフォスファミド	600mg/m ²	メイン	30分		○															
		生理食塩液	250mL																			
④		生理食塩液	50mL	メイン	全開		○															
⑤		デキサメタゾン	8mg	内服		オプション		○	○													

終了

減量・中止基準

中止基準

初回	白血球数4000/mm ³ 未満、血小板100000/mm ³ 未満、ヘモグロビン9g/dL未満、AST/ALT 100IU/L未満、T-Bil 1.5mg/dL未満、血清クレアチニン値1.5mg/dL、BUN 25未満mg/dL
2回目以降	白血球数2000/mm ³ 未満、血小板75000/mm ³ 未満、ヘモグロビン8g/dL未満、AST/ALT 100IU/L未満、T-Bil 1.5mg/dL未満、血清クレアチニン値1.5mg/dL、BUN 25未満mg/dL

減量基準

好中球減少	500/mm ³ 未満	中止、1段階減量
末梢神経障害	G3以上	ドセタキセル中止、1段階減量
肝機能障害	T-Bil 3.1～5mg/dL	シクロfosファミド25%減量
	T-Bil 5mg/dL超	シクロfosファミド中止
	AST/ALT 180IU/L超	シクロfosファミド25%減量
腎機能障害	GFR 10mL/min未満	シクロfosファミド25%減量