

## レジメンスケジュール

診療科	皮膚科
適応	血管肉腫
レジメン	皮膚weeklyPTX単独療法

申請・改訂日	2011年12月
備考	

クール関連	
下記の通り	

使用した臨床データ	
がん化学療法レジメンハンドブック(胃癌より引用)	

全クール																					
投与順	抗がん剤	薬品名	投与量	投与方法	時間・速度	備考	day1	...	day8	...	day15	...	...	...	...	...	...	...	day28		
①		デキサメタゾン注	6.6mg	メイン	15分		○		○		○										
		ファモチジン注	20mg				○		○												
		生理食塩液	50mL				○		○												
②		クロルフェニラミン注	5mg	メイン	15分		○		○		○										
		生理食塩液	50mL				○		○												
③	○	パクリタキセル	80mg/m2	メイン	180分	PVCフリー、フィルター付きルート	○		○		○										
		5%ブドウ糖液	250mL				○														
④		生理食塩液	50mL	メイン	15分		○		○		○										

終了

パクリタキセル	投与量
	通常量
	1段階減量

80mg/m2

60mg/m2

## 投与開始基準

パクリタキセル(胃癌より引用)

各コース開始時:白血球数3000未満または好中球数1500未満の場合。回復するまで延期。白血球1000以下の場合は次回減量。  
同一コース:白血球数2000未満または好中球数1000未満の場合。回復するまで延期。白血球1000以下の場合は次回減量。

## 減量・中止基準

パクリタキセル(胃癌より引用)

副作用	程度		処置
肝機能障害	10×ULN未満	1.26～2×ULN	AST/ALT/T-Bilによる減量 左記両方満たす場合25%減量
	10×ULN未満	2.01～5×ULN	左記両方満たす場合50%減量
	10×ULN以上	5×ULNを超える	左記どちらかを満たす場合中止
骨髄抑制	G4の白血球減少、G4の好中球減少、発熱性好中球減少症、G4以上の血小板減少症(2万未満)		次回の投与量を減量
その他の有害事象	G3以上		次回の投与量を減量
G2以上の神経障害、 関節痛、筋肉痛	G2以上		次回の投与量を減量