

レジメンスケジュール

診療科	消化器外科
適応	胃癌
レジメン	胃nab-PTX(100)毎週投与療法

申請・改訂日	2021年4月
備考	2nd line

クール関連
下記の通り

使用した臨床データ
がん化学療法レジメンハンドブック

全クール																			
投与順	抗がん剤	薬品名	投与量	投与方法	時間・速度	備考	day1	...	day8	...	day15	day28
①		デキサメタゾン注	6.6mg	メイン	30分		○		○		○								
		生理食塩液	50mL				○		○										
②	○	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	100mg/m2	メイン	30分	フィルター禁	○		○		○								終了
		生理食塩液	100mL																
③		生理食塩液	50mL	フラッシュ	10分		○		○		○								

投与量	nab-PTX
通常投与量	100mg/m2
1段階減量	80mg/m2
2段階減量	60mg/m2

減量：中止基準

nab-PTX		
副作用	コース内投与基準／次コース開始基準	減量基準
好中球数	1000/mm ³ 以上	500/mm ³ 未満
FN	認めない／回復	発現
血小板数	75000/mm ³	25000/mm ³ 未満
AST/ALT	ULN × 2.5倍以下(原疾患に起因または肝転移を有する場合は施設基準値上限の5倍)	医師が同一容量で投与継続困難と判断
末梢神経障害	G2以下	G3以上(G2以下であっても減量を考慮してよい)
皮膚障害	G1以下	G2以上
粘膜炎・下痢	G1以下	G3以上
その他非血液毒性(脱毛を除く)	G2以下	G3以上