

## レジメンスケジュール

|      |                |
|------|----------------|
| 診療科  | 消化器外科          |
| 適応   | 進行・再発胃癌・癌性腹膜炎  |
| レジメン | 胃weeklyPTX単独療法 |

|        |          |
|--------|----------|
| 申請・改訂日 | 2009年4月  |
| 備考     | 2nd line |

|       |
|-------|
| クール関連 |
| 下記の通り |

|                  |
|------------------|
| 使用した臨床データ        |
| がん化学療法レジメンハンドブック |

| 全クール |      |            |         |      |       |                   |      |     |      |     |       |     |     |     |     |     |     |     |       |  |  |
|------|------|------------|---------|------|-------|-------------------|------|-----|------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|--|
| 投与順  | 抗がん剤 | 薬品名        | 投与量     | 投与方法 | 時間・速度 | 備考                | day1 | ... | day8 | ... | day15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | day28 |  |  |
| ①    |      | デキサメタゾン注   | 6.6mg   | メイン  | 15分   |                   | ○    |     | ○    |     | ○     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |  |
|      |      | ファモチジン注    | 20mg    |      |       |                   | ○    |     | ○    |     | ○     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |  |
|      |      | クロルフェニラミン注 | 5mg     |      |       |                   | ○    |     | ○    |     | ○     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |  |
|      |      | 生理食塩液      | 100mL   |      |       |                   | ○    |     | ○    |     | ○     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |  |
| ②    |      | 生理食塩液      | 50mL    | メイン  | 30分   |                   | ○    |     | ○    |     | ○     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |  |
| ③    | ○    | パクリタキセル    | 80mg/m2 | メイン  | 60分   | PVCフリー、フィルター付きルート | ○    |     | ○    |     | ○     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |  |
|      |      | 5%ブドウ糖液    | 250mL   |      |       |                   | ○    |     | ○    |     | ○     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |  |
| ④    |      | 生理食塩液      | 50mL    | メイン  | 全開    |                   | ○    |     | ○    |     | ○     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |  |

終了

|         |         |
|---------|---------|
| パクリタキセル | 投与量     |
| 通常量     | 80mg/m2 |
| 1段階減量   | 60mg/m2 |

## 投与開始基準

### パクリタキセル

各コース開始時：白血球数3000未満または好中球数1500未満の場合。回復するまで延期。白血球1000以下の場合は次回減量。  
同一コース：白血球数2000未満または好中球数1000未満の場合。回復するまで延期。白血球1000以下の場合は次回減量。

## 減量・中止基準

### パクリタキセル

| 副作用                   | 程度  |            | 処置                                   |
|-----------------------|---|------------|--------------------------------------|
| 肝機能障害                 | 10×ULN未満                                      | 1.26～2×ULN | AST/ALT/T-Bilによる減量<br>左記両方満たず場合25%減量 |
|                       | 10×ULN未満                                      | 2.01～5×ULN | 左記両方満たず場合50%減量                       |
|                       | 10×ULN以上                                      | 5×ULNを超える  | 左記どちらかを満たす場合中止                       |
| 骨髄抑制                  | G4の白血球減少、G4の好中球減少、発熱性好中球減少症、G4以上の血小板減少症(2万未満) |            | 次回の投与量を減量                            |
| その他の有害事象              | G3以上  |            | 次回の投与量を減量                            |
| G2以上の神経障害、<br>関節痛、筋肉痛 | G2以上  |            | 次回の投与量を減量                            |