

レジメンスケジュール

診療科	消化器外科
適応	膵臓癌
レジメン	膵GEM+nab-PTX療法

申請・改訂日	2015年1月
備考	

クール関連

使用した臨床データ
適正使用ガイド、がん化学療法レジメンハンドブック

全クール																			
投与順	抗がん剤	薬品名	投与量	投与方法	時間・速度	備考	day1	...	day8	...	day15	day28
①		パロノセトロン注	0.75mg	メイン	15分		○		○		○								
		デキサメタゾン注	6.6mg				○		○		○								
		生理食塩液	50mL				○		○		○								
②		クロルフェニラミン注	5mg	メイン	15分		○		○		○								
		生理食塩液	50mL																
③		生理食塩液	50mL	メイン	全開		○		○		○								
④	○	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	125mg/m2	メイン	30分	禁フィルター	○		○		○								終了
		生理食塩液	100mL																
⑤		生理食塩液	50mL	メイン	全開		○		○		○								
⑥	○	ゲムシタビン	1000mg/m2	メイン	30分		○		○		○								
		生理食塩液	100mL																
⑦		生理食塩液	50mL	メイン	全開		○		○		○								

投与量	nab-PTX	ゲムシタビン
通常投与量	125mg/m2	1000mg/m2
1段階減量	100mg/m2	800mg/m2
2段階減量	75mg/m2	600mg/m2

投与可能基準

項目	day1	day8、day15
好中球数	1500/mm3以上	1000/mm3超(添付文書では500/mm3超でも投与可能、適正使用ガイドでは慎重と記載)
血小板数	100000/mm3以上	50000/mm3以上
FN	投与不可	
AST/ALT	基準値上限×2.5以下	-
末梢神経障害	G2以下または前のコースでG3以上が発現した場合、G1に回復後投与可能 (末梢神経障害はnab-PTXのみ対象)	
口腔粘膜炎		
下痢		

減量・中止基準

副作用	程度	対処法
好中球減少	500/mm3未満が7日以上継続	1段階減量
血小板減少	50000/mm3未満	1段階減量
FN	発現	1段階減量
末梢神経障害	G3以上	1段階減量(nab-PTXのみ)
皮疹	G2以上	1段階減量
口腔粘膜炎	G3以上	1段階減量
その他	間質性肺炎、脳神経麻痺・黄斑浮腫(とくにnab-PTX)	投与中止