

## レジメンスケジュール

診療科	血液内科
適応	多発性骨髄腫
レジメン	血内MM Bd療法

申請・改訂日	2015年10月
備考	

クール関連	
-------	--

使用した臨床データ	
がん化学療法レジメンハンドブック	

全クール																			
投与順	抗がん剤	薬品名	投与量	投与方法	時間・速度	備考	day1	...	day8	...	day15	...	day22	...	...	...	...	...	day35
①	○	デキサメタゾン	20mg/body	内服/点滴			○		○		○		○						
②	○	ボルテゾミブ	1.3mg/m2	皮下注			○		○		○		○						終了
		生理食塩液	1.2mL/Vで溶解																

ボルテゾミブ投与量	
通常量	1.3mg/m2
1段階減量	1.0mg/m2
2段階減量	0.7mg/m2
3段階減量	投与中止

## 減量・中止基準

ボルテゾミブ		
副作用	程度	処置
血液毒性	G4	回復するまで休薬する。投与を再開する場合は減量する。 用法用量は変更しなくてもよい。
末梢性ニューロパ チー、神経障害性疼痛	疼痛または機能消失を伴わないG1(症状がない:深部腱反射の低下または知覚異常)	1段階減量する。
	疼痛を伴うG1またはG2(中等度の症状がある:身の回り以外の日常生活動作が制限されている)	回復するまで休薬。回復した場合は0.7mg/m <sup>2</sup> 週1回投与に変更する。
	疼痛を伴うG2またはG3(高度の症状がある:身の回りの日常生活動作が制限されている) G4(生命を脅かす:緊急処置を必要とする)	投与中止
上記以外の非血液毒性	G3以上	回復するまで休薬する。投与を再開する場合は減量する。