

レジメンスケジュール

診療科	血液内科
適応	急性骨髄性白血病、骨髄異形成症候群
レジメン	血内CA療法

申請・改訂日	2020年2月
備考	

クール関連	
-------	--

使用した臨床データ	がん化学療法レジメンハンドブック等
-----------	-------------------

全クール																				
投与順	抗がん剤	薬品名	投与量	投与方法	時間・速度	備考	day1	day2	day3	day4	day5	day6	day7	day8	day9	day10	day11	day12	day13	day14
①		パロノセトロン注	0.75mg	メイン	15分		○							○						
		生理食塩液	50mL																	
②	○	アクリルピシン	10mg	メイン	24時間	アクリルピシン累積投与量 600mg/body以上で心電図異常 ミキシングはアクリルピシン→シタラ ピンの順に行うこと	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	シタラピン	20mg																	
		5%ブドウ糖液	500mL																	

減量・中止基準

アクリルピシン

副作用	程度	処置
心機能低下	発現時(総投与量600mg/bodyまで)	投与中止
肝機能障害	発現時	投与中止
腎機能障害	発現時	投与中止

シタラピン

副作用	程度	処置
アレルギー	強発現時	投与中止
肝機能障害	T-Bil 2mg/dL以上	投与中止
腎機能障害	血清クレアチニン値 2mg/dL以上	投与中止